

OBSERVATORIO AFICIONADO CRUZ DEL SUR

Cochabamba Bolivia

A. Gonzalo Vargas B.

Marzo 28 2016

Reporte No. 69

POSIBLE NUEVA RADIANTE METEÓRICA


Como ya lo sabemos, el cometa 252P/LINEAR se dividió en dos partes (dos cometas). Ambas partes o fragmentos de este cometa pasaron cerca del planeta hace unos días y es posible que la Tierra al cruzar por la zona encuentre partículas de uno de los cometas. Si esto sucede es muy posible que podamos ver algunos meteoros.

De acuerdo a los estudios y pronósticos, la Organización Internacional de Meteoros (IMO) Mikhail Maslov indicó que hay una posibilidad de tener un episodio de meteoros débiles y muy lentos (15 km/seg) entre el 28 y 30 de marzo (observar desde que oscurece) la radiante está situada cerca de la estrella μ Leporis, en la constelación de Lepus. Se estima unos 5 a 10 meteoros por hora.

Como siempre, una cosa son las estimaciones teóricas y otra la observación en vivo que puede demostrar que las estimaciones fueron válidas o erróneas. Así que lo más aconsejable es estar atentos y observar los alrededores de la estrella μ Leporis. Los meteoros se verían como trazos radiales saliendo de la zona donde está la estrella μ Leporis. Abajo vemos una carta celeste parcial que muestra la constelación de Lepus y la estrella μ Leporis.

Los meteoros si se produce esta radiante, serán vistos en torno a esta zona entre la constelación de Orión y el Can Mayor donde tenemos a la brillante estrella Sirio.

Debemos observar desde un lugar donde no tengamos luces que deslumbren. La observación es a simple vista, debemos anotar el número de meteoros que veamos y registrar la hora a la que observamos cada meteorito.



Cielos Claros!!!